

# 猪乳腺上皮细胞

## 一、基本信息

细胞名称	猪乳腺上皮细胞
细胞品牌	江蓝纯生物
种属来源	成年母猪
组织来源	乳腺
生长特性	贴壁生长
形态特征	上皮细胞样
细胞简介	乳腺位于皮下浅筋膜的浅层与深层之间。浅筋膜伸向乳腺组织内形成条索状的小叶间隔，一端连于胸肌筋膜，另一端连于皮肤，将乳腺腺体固定在胸部的皮下组织之中。乳房腺体由 15-20 个腺叶组成，每一腺叶分成若干个腺小叶，每一腺小叶又由 10-100 个腺泡组成，这些腺泡紧密地排列在小乳管周围，腺泡的开口与小乳管相连。乳腺上皮细胞来源于乳腺小叶中。它们与腺体导管和脂肪组织一起在乳腺中形成复杂的网络结构。乳腺上皮细胞在人和动物体出生、发育和妊娠中均会受荷尔蒙调控而进行一系列的增长、迁移和分化。激素水平失调、细胞外基质的变化和其它的基因因素都会导致乳腺上皮细胞恶性增长，最终导致乳腺癌的发生。了解乳腺上皮细胞的特性可以帮助我们理解乳腺癌的病例机制以及为治疗确定新的靶点。
质量检测	细胞角蛋白-8 (CK-8) 免疫荧光染色为阳性，纯度高于 90%，且不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等

细胞规格	5x10 <sup>5</sup> cells/T25 或 1mL 冻存管
培养基	猪乳腺上皮细胞完全培养基
培养条件	气相：95%空气+5%二氧化碳；温度：37°C
换液频率	每 2-3 天换液一次
消化液	0.25%胰蛋白酶
细胞货期	5-6 周左右
发货方式	复苏发货（免运输费用）/ 冻存发货（需加干冰运输费用）
供应范围	仅限于科研实验使用，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用
特别说明	具体操作步骤以随货产品说明书为主

## 二、细胞培养操作

收货处理	取出 T25 细胞培养瓶，用 75% 酒精消毒瓶身，拆下封口膜，放入 37°C、5%CO <sub>2</sub> ，饱和湿度的细胞培养箱中静置 3-4h，以稳定细胞状态
传代密度	细胞密度达 80%-90%，即可进行传代培养
传代比例	首次传代建议 1: 2 传代，1:2 传代就是 1 个 T25 瓶传 2 个 T25 瓶或者 2 个 6cm皿。不是 1 个 T25 瓶传 2 个 10cm 皿
传代方法	<p>1. 吸出 T25 细胞培养瓶中的培养基，用 PBS 清洗细胞一次；</p> <p>2. 添加 0.25% 胰蛋白酶消化液 1mL 至 T25 培养瓶中，轻微转动培养瓶至消化液覆盖整个培养瓶底后，吸出多余胰蛋白酶消化液，37°C 温浴 1-3min；倒置显微镜下观察，待细胞回缩变圆后，再加入 5ml 完全培养基终止消化；</p> <p>3. 用吸管轻轻吹打混匀，按 1:2 比例接种 T25 培养瓶传代，然后补充新鲜的完全培养基至 5mL，置于 37°C、5%CO<sub>2</sub>、饱和湿度的细胞培养箱中静置培养；</p>

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>4.</b> 待细胞完全贴壁后，培养观察；之后每2-3天换液一次新鲜的完全培养基。 |
|--|--|

### 三、注意事项

重要提醒	<b>1.</b> 培养基于4°C条件下可保存3-6个月。 <b>2.</b> 在细胞培养过程中，请注意保持无菌操作。 <b>3.</b> 传代培养过程中，胰酶消化时间不宜过长，否则会影响细胞贴壁及其生长状态。 <b>4.</b> 运输用的培养基（灌液培养基）不能再用来培养细胞，请换用按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基来培养细胞。
到货须知	<b>1.</b> 收到细胞后，首先观察并拍照记录细胞瓶是否完好，培养液是否有漏液、浑浊等现象，干冰运输的细胞检查干冰是否完全挥发，细胞是否解冻，若有上述现象发生请及时和我们联系。 <b>2.</b> 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照（当天以及第2,3天请拍照），记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。 <b>3.</b> 由于运输的原因，部分细胞由于温度变化及剧烈碰撞死亡破碎形成碎片，是正常现象。个别敏感细胞会出现不稳定的情况，请及时和我们联系，告知细胞的具体情况，以便我们的技术人员跟踪回访直至问题解决。 <b>4.</b> 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等，确保细胞培养条件一致，若由于培养条件不一致而导致细胞出现问题，责任由客户自行承担。

### 四、售后服务

细胞予重发	<b>1.</b> 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 <b>2.</b> 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 <b>3.</b> 收到细胞3天内，发现污染问题，经核实后，重发。 <b>4.</b> 常温发货的细胞静置2小时后，干冰冻存发货的细胞复苏2天后，绝大多数细胞未存活，经核实
-------	--

	<p>后，重发。</p> <p><b>5.</b> 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。</p> <p><b>6.</b> 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。</p>
细胞不重发	<p><b>1.</b> 客户操作造成细胞污染，不重发。</p> <p><b>2.</b> 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。</p> <p><b>3.</b> 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。</p> <p><b>4.</b> 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。</p> <p><b>5.</b> 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。</p> <p><b>6.</b> 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。</p>